

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

## NORD-PAS-DE-CALAIS

### GRANDES CULTURES

**BULLETIN N° 9 DU 11 MAI 1993**

#### BLE D' HIVER

Oïdium : forte pression, bien contrôlée..

Septoriose : pression limitée.

Rouille jaune : des symptômes sur Béthune, Montreuil.

Fongicide : attendre.

Pucerons : en cours d'installation.

#### ESCOURGEON

Helminthosporiose : présence moyenne. Fongicide : intervenir.

#### ORGE de PRINTEMPS

Oïdium en nette progression. Fongicide : intervenir.

#### BLE D'HIVER

##### ► SITUATION:

► **Stade** : 2 noeuds est le stade moyen. Les parcelles précoces sont à apparition de la dernière feuille, tout début gonflement.

► **Oïdium** : Très actif sur variétés sensibles surtout APOLLO, SIDERAL et EUREKA, ces 3 variétés étant attaquées en toute situation.

SOISSONS est parfois concerné (Flandre, Plaine de la Lys) de même que RITMO, ARCHE et SLEJPNER (moins de 10 % des cas).

A l'inverse, BEAVER, RIBAND, FORBY, VIVANT sont pratiquement résistantes.

Au total, on peut estimer que moins de 30 % des parcelles de la région ont été concernées par l'oïdium et ont justifié une intervention fongicide contre cette maladie. On peut noter pour cette année un bon niveau d'efficacité des fongicides (morpholines et même triazoles) sur oïdium, à condition toutefois que le traitement ait été réajusté suffisamment tôt (fin Avril au plus tard).

► **Septoriose** : Petite présence générale sur feuilles moyennes. SLEJPNER, RIBAND et SOISSONS sont les plus concernées mais en net retrait par rapport à l'an dernier. Suite aux contaminations actuelles, on peut prévoir une forte expression des symptômes entre le 20 et le

25 mai. **Attention aux confusions** avec des symptômes de phytotoxicité. Des traitements ont été réalisés par forte chaleur pendant la dernière semaine d'Avril, ils ont parfois occasionné des brûlures sur feuilles supérieures.

► **Rouille jaune** : Confirmation de la sensibilité de RITMO, très souvent attaqué en Flandre au même titre que SLEJPNER. De nouveaux cas sont observés dans les secteurs de Montreuil, Béthune et La Bassée. Quelques symptômes sont signalés sur HORNET et HAVEN.

► **Pucerons et lémas** : Début d'installation.

► **PRECONISATION** : La pression parasitaire actuelle étant modérée, il n'y a pas d'urgence à appliquer le **traditionnel traitement gonflement dit T2**. L'objectif est de se préparer à une intervention **épiaison avancée** à la fin du mois de Mai, soit juste avant la sortie des épis.

La persistance d'action des nouveaux fongicides est mieux valorisée dans des interventions précoces que dans des interventions tardives.

♦ REPUBLIQUE FRANÇAISE

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

D.R.A.F. - S.R.P.V.

Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : (dont Avertissements Agricoles)

Z.A.L. du Grand Mont - Rue B. Palissy - B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement

annuel :

A l'ordre

Régisseur de Recettes

D.R.A.F. Nord-Pas-de-Calais

ISSN 0758-7988 - CPPAP N°1885 AD

16

==> Dans la majorité des parcelles, on optera donc pour une **stratégie d'attente jusqu'à fin Mai**.

==> A l'inverse, le traitement "gonflement" (T2) devra être appliqué rapidement dans un certain nombre de situations :

\* **Rouille jaune** dans la parcelle : Intervenir avec ALTO, HORIZON, PLANETE R, OPUS, etc...).

\* **Oïdium** mal contrôlé. Choisir une association triazoles + morpholines.

\* **Septoriose** bien présente sur F3. Choisir un **produit de contact** (chlorothalonil, mancozèbe, anilazine...) relayé fin Mai par un produit haut de gamme ou une association **triazole + contact** qui sera probablement à renouveler en pleine épiaison (mi Juin).

Insecticide non justifié actuellement.

## ESCOURGEON

### ► SITUATION :

► **Stade** : sortie des barbes à début épiaison.

► **Helminthosporiose** : moins active qu'en 92 et 91. Progresse.

► **Rhynchosporiose, oïdium et rouille naine** : pas d'évolution.

► **PRECONISATION** : Intervention fongicide justifiée. Privilégier l'efficacité helminthosporiose. Choisissez des triazoles performantes ou des associations triazoles + pyrazophos.

## ORGE DE PRINTEMPS

### ► SITUATION :

► **Stade** : Début montaison : le 1er noeud est parfois atteint.

► **Oïdium** souvent virulent.

► **Helminthosporiose** en cours de repiquage.

► **PRECONISATION** : Intervention fongicide à déclencher rapidement avec associations triazoles + morpholines. Insecticide : attendre.

## AUTRES CULTURES

### POIS - BETTERAVE - COLZA - LIN

Pas d'urgence sauf en charançons des siliques du colza qui doivent être contrôlés si ce n'est déjà fait. Un bulletin fera le point sur ces questions en fin de semaine.